

識
病
捷
法

○死症

名五

面腫有白點肺敗

掌中無紋為心敗

腹滿青筋為腎敗

臍突出者為脾敗

脚跟腫脹為肝敗

○辯驗男子中滿胸痺氣分法

中滿是氣虛

胸痺是氣實

氣分病是熱飲所隔氣血不行腹滿脇鳴陽
氣不通身冷陰氣不通骨疼陽先通惡寒陰
通則痺不仁陰陽相得其氣乃行

○辯驗婦人氣分血分法

氣分是先斷月經後患水病名曰氣分
血分是先患水病後斷月經名曰血分

○辯驗胃中脹

脾寒

中濕

心痺

肝虛

脾傷

脾熱

飲聚

女疸

○辯驗小腹脹

面腫

肺水

肺中風

腎虛熱

胃寒

腸癰

腎中風

女勞疸

三焦虛寒

○治法

凡癥脹朝寬暮急血虛

凡癥脹朝急暮寬氣虛

凡癥脹朝暮俱急氣血俱虛

凡癥脹產後必大補氣血少佐蒼朮茯苓為使其水自降

凡虛脹補脾以養肺流濕以散氣治以參朮佐以平胃茯苓血虛加四物湯瘀血加桃仁凡癥脹補中行濕利小便降陰火生新血切不可下用人參二朮陳皮為主佐以黃芩麥門

冬制肝厚朴木香木通氣下陷柴胡提之血
虛加血藥隨症加減

凡中滿瀉之於內此良法也

凡腹脹按之不堅不痛宜消之次補之

凡癥脹病淺脾胃尚壯畧與疎導不可峻利

凡癥脹用禹餘糧丸制肝木補脾土切須隨症

加減

凡飲食失節為脹受病之始也

凡癥脹年深求速効者反取禍須知戒助藥力

凡初得病是氣脹久久則成水脹

○禁忌

遠音樂

斷妄想

遠地板房

遠樓房

却厚味

忌鹽醬醋

蠱脹

似有虫食於內之義其繆固之氣結於腸間難治○服消脹丸或遇仙如意丹

濁氣脹

濁氣在上生膈脹清氣在下生飧瀉○服木香順氣丸

氣脹

氣入血分逆則為氣脹○服木香流氣飲
氣虛中滿

用四君子湯加川芎芍藥厚朴陳皮甘草

怒氣腹脹

用青皮陳皮香附木香青黛

血脹

血入氣分逆則為血脹其症煩燥喘急虛汗厥
逆小便赤大便黑○服木香流氣飲加蘇木紅
花

蓄血腹脹

用抵當湯

風寒濕腫

有傷風濕而腫有傷冷濕而腫氣血凝澁脉浮
緩治宜發散風濕

寒脹

冬月感寒胸中痞滿脉來沉細名曰寒脹○服
中滿分消丸

暑脹

夏月寒熱胸腹堅滿脉來虛弱名曰暑脹○服
清熱分消丸

熱脹

腹脹發熱大便秘實脉來洪數名曰熱脹○服枳實湯

胸腹急脹

內有伏熱或因瀉痢及熱乘虛入脾脉數○治宜解熱

腸覃

寒氣客腸外與正氣相搏其始如鷄子至大如懷胎按之則堅推之則移月水不準女人有此症治宜導下

外寒鬱內熱腹脹

用藿香麻黃乾葛為主藥

虛脹

皮膚殼殼然而堅不痛但氣滿名曰虛脹○服

參香散

產後腹脹

大補氣血藥加白朮厚朴茯苓半夏陳皮黃芩

實脹

挾宿食邪實於內按之堅痛名曰實脹○治宜

疎氣滌食木香枳榔丸

壯盛脉實人腹脹

是氣聚下焦可攻之便收拾以白朮厚朴佐之
久病脹

凡人病久腹脹滿者脾土已敗是為危證○姑
用白朮四兩飯上蒸厚朴姜汁拌炒為末每服
一錢陳皮湯送下一日服三次

久脹

腹脹經久忽瀉數升晝夜不止○方見泄瀉門
膨脹

飢飽傷脾脾氣若虛遲於尅化少有停滯即為

脹滿脉來浮滑○治宜消導所滯

積聚脹

五積久必心腹脹亦有不待成積即致者○服
海金沙丸

穀脹

因失飢傷飽痞悶停酸旦食不能暮食○服大
異香散

諸虫毒脹

方見積聚門

酒積腹脹

切不可用瀉藥用生地人參白芍藥木通乾葛
厚朴黃連海金砂陳皮甘草夜服溫中丸

腹脹挾內傷

服木香順氣湯

肥胖人腹脹

是濕痰在脾胃用平胃散五苓散合而服之

瘦人腹脹

是脾胃積熱用黃連厚朴香附白芍為主藥

肥白人腹脹

是氣虛用人參白朮厚朴陳皮為主藥

三焦脹

大小便不通卒然脹滿脉来沉伏名曰三焦脹

肺脹

虛滿咳嗽

心脹

煩心短氣卧不安

脾脹

善噦四肢倦躄重不勝衣卧不安

肝脹

脇痛引小腹

腎脹

引背央央然腰髀痛

胃脹

腹滿胃脘痛妨食聞焦臭大便難

大腸脹

腸鳴痛冬寒飧瀉

小腸脹

小腹填滿引腰痛

膀胱脹

小腹氣滿氣痿

胆脹

脇痛口苦善大息

膚脹

寒氣客於皮中空空不堅腹身大色不變按之不起

鼓脹

腹脹身皆大色蒼黃腹筋起

石瘕脹

寒氣結子門閉塞不通惡血當瀉不瀉衄血留止日漸大如胎月水不隄此女子生於胞中名

石瘕治宜導下

單脹

與蠱脹同

加味枳朮湯

枳殼

白朮

辣桂

紫蘇梗

陳皮

檳榔

桔梗

木香

五靈脂

各錢一

半夏

茯苓

甘草

各五分

每服水二鍾半

姜三片煎至一鍾食前服

麥門冬湯

麥門冬

甘草

各錢半

旋覆花

白茯苓

羌活

白芍藥

玄參

白朮

柴胡

人參

桑白皮

升麻

當歸

錢各一

木香

分五

熟地

黃

一分錢

胡黃連

分三

右分作二服

每服水二鍾

煎至一鍾不拘時服

大腹木香湯

大腹子

半夏

木香

錢各二

枳殼

前胡

白芷

肉桂

陳皮

白朮

錢各一

當歸

玄胡索

柴胡

芍藥

旋覆花

甘草

錢各五

乾姜

人參

分各三

右分作二服每

服用水二鍾姜三片煎至八分食前熱服

枳實湯

枳實

大黃

錢各二

厚朴

錢三

桂心

分八

甘草

錢一右水二鍾姜三片煎八分服

參香散

人參

官桂

甘草

各七

桑白皮

桔梗

陳皮

枳實

麥門冬

大腹皮

半夏

青皮

錢各一

茯苓

香附

紫蘇子

木香

各錢二分右分作二服每服水二姜三煎一食前服

大異香散

三棱

蓬朮

半夏麴

陳皮

藿香

桔梗

枳殼

香附

益智

錢各半

甘草

分五右分作二服每服水二姜三煎一食遠服

平胃散

陳皮

甘草

蒼朮

厚朴

各半

右水

二鍾生姜三片煎至八分食遠服

三白散

白牽牛

兩一

桑白皮

白朮

木通

陳皮

錢各五

右為末每服二錢空心姜湯調小兒五分

神効木香散

治二十四腫鼓病

本香

沉香

錢各二

砂仁

苦葶藶

益智

連翹

錢各三

甘遂

錢四

椒目

桑白皮

枳殼

白牽牛

半炒

木通

黑牽牛

半炒

陳皮

青皮

澤瀉

大黃

炒各五錢

檳榔

胡椒

各一錢

右為

末醋糊丸

如梧桐子大每服五錢空心五更嚼

葱白湯下

上消

次服橘皮湯送下

中消

第三服桑白

皮湯送下

下消

倘有餘腫沉香湯送下忌鹽醬

消脹丸

木香

茯苓

厚朴

澤瀉

各一兩

滑石

黑牽牛

取頭末各六兩

右為末水丸如梧桐子大每服

五十丸食前白滾湯送下

遇仙如意丹

白茯苓

青皮

陳皮錢各一

石菖蒲

人參

白豆蔻

丁香

三稜

蓬朮

白朮

砂仁

官桂

遠志

木香

錢各三

牽牛

取頭末
炒八兩

山藥

甘草錢各五

香附

重便浸
炒五兩

右

為末醋糊丸如梧桐子大每服一百二十九丸臨

睡白滾湯送下看老少虛實加減服水臌每服

三百丸婦人月事不調腹中有惡物並宜服之

利後飲水一口即住利後可服甘露飲補之

海金沙丸

沉香錢三

海金沙

錢半輕粉

錢一

牽牛

炒頭末
一兩

右

為末用獨頭蒜丸如梧桐子大每服三四十丸
空心用燈心木通湯送下

中滿分消散 治中滿寒脹

川烏 澤瀉 黃連 人參 青皮

當歸 生薑 麻黃 葶藶 紫胡

乾姜 各二錢 益智 半夏 茯苓 木香

升麻 各三錢 黃芪 吳茱萸 草豆蔻 厚朴

黃栢 各五錢 右分作十服每服水二鍾姜三片煎

至八分食前熱服

中滿分消丸 消中滿熱脹

人參

白朮

甘草

姜黃

錢各一

茯苓

生薑

砂仁

錢各二

澤瀉

陳皮

錢各三

黃連

半夏

枳實

錢各五

厚朴

兩一

黃芪

二錢

知母

錢四

楮苓

錢一

右為末蒸餅陳米粉糊丸如

梧桐子大每服百丸白滾湯送下

禹餘糧丸

蛇含石

兩三

針砂

兩五

禹餘糧

針三

兩同

已上三味為主其次量人虛實入下項藥

木香

牛膝

蓬莪朮

桂心

川芎

茴香

三稜

白蒺藜

羌活

茯苓

乾姜

青皮

白豈仁

陳皮

附子

當歸

錢各五

右為末湯浸蒸餅為丸如梧桐子大

每服五十丸空心溫酒下

木香順氣丸

京三稜

石三稜

蘿蔔子

檳榔

半夏

白茯苓

陳皮

人參

雞爪三稜

各一兩

白豆蔻

縮砂

各半兩

木香

一兩

黑牽牛

取頭末五兩

右為末姜汁麪糊為丸如梧桐子大每服五十

丸食後姜湯送下

木香流氣飲

半夏

二兩

香附子

厚朴

紫蘇葉

青皮

甘草

各一斤

蓬莪朮

肉桂

丁香皮

枳櫛

大腹皮

藿香葉

草果仁

木香

各六兩

白芷

赤茯苓

麥門冬

石菖蒲

乾木瓜

人參

白朮

各四兩

陳皮

去白二斤

木通

去節八兩

右咬咀

每服四

錢水盞半姜三片棗二枚煎七分熱服

溫中丸

白朮

二兩

乾姜

半夏

各一兩

細辛

胡椒

各五錢

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服五十九

空心姜湯送下

木香順氣湯

見氣門諸

清熱分消丸

開卷末

木香枳榔丸

見氣門諸

大橘皮湯

見腫門水

塗臍膏

即車水腫門法

四君子湯

見胃門脾

四物湯

見血門諸

抵當湯

見黃門

五苓散

見濕門

水腫門

有二十八名

水氣腫脹與鼓脹形症相似治各不同另立篇目
水氣本於腎末於肺腎病為跗腫肺病為喘呼不
得卧諸臟皆可患水故有十水之名及論其陽水
陰水老少虛實不可便用大戟芫花甘遂巴豆之
藥大利其水暫取一時之効水去則脾土愈敗臨
症詳審不致危殆也

○生脉

道三

洪大實

○死脉

道四

微 細 虛 小

○死症

名十二

肚臍凸出死 缺盆平者死 虛者死

腹大脉實死 足心平者死 唇焦死

脚腫入腹死 手掌無紋死 背平死

腹起青筋死 腫從四肢後入腹者死

滑泄者死

○辯驗水腫法

看驗之法在何部分微腫先見於目下如卧

·
蚕之狀脛脉動時欬股間寒足脛腫腹乃大
其水病已成以手按腫處隨手而起即此候
也濕腫氣腫初起頗相似但以手按或凹不
即起者濕也水腫有濕熱相兼朝急暮寬是
氣虛朝寬暮急是血虛朝暮俱急是氣血俱
虛

○禁法

禁食羊頭蹄肉食之百無一愈
遠音樂遠樓板房斷鹽醬厚味

○治法

凡水腫利小便順氣和脾水自行

凡少壯病腫脉浮大宜導去其水

凡老弱病腫脉微細宜補中行濕

凡腰已上腫者宜發汗之

凡腰已下腫者宜利小便

凡十腫水腫並用神助丸

一青水先從左脇腫起根在肝

大戟

二赤水舌根或腳跟腫起根在心

葶藶

三黃水從腰腹腫起根在脾

甘遂

微炒

四白水從腳腫起根在肺

桑白皮

五黑水從外腎腫起根在腎

連翹

六玄水從面腫起根在腎

芫花炒醋

七風水從四肢腫起根在胃

澤瀉微炒

八石水從腎腫起根在膀胱

梹榔

九蒿水從小腹腫起根在小腸

巴豆去油

十氣水或盛或衰根在腹

赤小豆

○取水法

地龍楮苓去皮鉞砂各一兩為細末搗葱涎

調成膏敷臍中約一寸高濶絹帛束之以小

便多為度一日兩易

湧水

肺移寒
於腎

囊裏漿或遍身腫滿按腹不堅疾行則濯濯有聲或喘欬不定○服葶藶丸

陽水

遍錢腫煩渴小便赤大便澀脉沉數○服五皮散磨入生松脂不愈再服踈鑿飲

陰水

遍錢腫不煩渴大便溏小便少脉沉伏○服木香沝氣飲

水在上

肺病

喘呼不得卧○服甘草麻黃湯

水在下

腎病

臌腫腹大○服五苓散

濕氣似水

見濕門

脚氣似水

見濕門

通身虛腫

見濕門

濕熱為水

濕熱內甚心腹脹小便不利大便滑洩○服大橘皮湯

水氣熱脹

見痞滿門

脾腎俱虛發為水腫

四肢俱浮心腹堅脹小便不通兩目下腫○服復元丹

男子陰腫

大如升核痛○用馬鞭草搗塗之

女人陰腫

婦人陰戶腫硬○用松實半斤剉碎炒熟布裹熨之冷再炒再熨

浮囊腫

用五苓散水煎湯洗再溫再洗仍與五苓散加灯心煎服

浮腫

脾寒久不愈傳為浮腫○治宜祛寒益脾土滲濕

遍身浮腫

肺氣隔於膜運行不得脉浮○治宜調肺通氣

泄瀉後通身腫似水

或肘腫或水氣者○服茯苓湯

脾胃濕勝傷冷似水

泄瀉肘腫如水氣者○服胃苓湯

大橘皮湯

大橘皮

兩半

木香

錢一

滑石

錢六

檳榔

錢三

楮苓

澤瀉

白朮

桂枝

錢各五

茯苓

兩一

甘草

錢二右分作六服每服水二鍾煎至一鍾服

五皮散

五加皮

地骨皮

大腹皮

茯苓皮

生姜

皮錢各半二右水二鍾煎至一鍾食遠服忌生冷油

膩堅硬之物一方去五加皮加陳皮桑白皮

神助丸治十種水氣面目四肢浮腫

黑牽牛頭末澤瀉錢各二楮苓椒目錢各半二葶藶

錢五右作二服每服水二鍾葱白三根煎至一鍾

入酒半盞清早向東立服如人行十里又以漿

水葱白煮稀粥候葱爛入酒五合量人所飲多

少須服一升自早至午當利小便三四升或大

便微利喘定腫減隔日再服

十水丸

遠志

椒目

肉豆蔻

菖蒲

九一節寸

羌活

大戟

各一兩

楮苓

乾葶藶

白牽牛

木頭

澤瀉

錢各五

右為末面糊為丸如梧桐子大每服三十

丸食前米湯送下

葶藶丸

乾葶藶

黑白牽牛

半半生炒

白朮

錢各五

羌活

桑白皮

赤茯苓

漢防己

陳皮

澤瀉

郁李仁

湯色另研去皮火炒三錢

右為末煉蜜為丸如

梧桐子大初服十丸加至三十丸空心晚間食

前陳皮湯送下一日服二次以利為度

郭藥

石治腹

陰

大如

大戟

芫花

甘遂

海藻

各等

右為

末醋面和藥攤綿紙上先用甘草口內嚼後用此藥貼腫硬處以布裹住

甘草麻黃湯

麻黃

四兩

甘草

二兩

右咬咀每服三錢水一鍾煮

麻黃再滯後入甘草煎七分取汗慎冒風老人

虛人不可輕用

茯苓湯

黃芩

錢半

當歸

錢二

肉桂

甘草

各半

猪苓

經方集注卷之四

茯苓

各三分

澤瀉

各五分

芍藥

七分

蒼朮

柴胡

生甘草

升麻

各一錢

右作一服水二煎一熱服

木香

氣飲

見症

胃苓湯

胃

即

平

胃

散

疎鑿飲

開

車

五苓散

見

渴

五

苓

散

復元丹

開

車

咳嗽門

有五十七名

咳者無痰有聲是肺氣傷而不清嗽者無聲有痰是脾濕動而生痰咳嗽者有痰有聲因傷於肺氣又動於濕也凡有痰者寒少熱多咳嗽始關於肺終則聚於胃使人多涕唾五臟咳嗽不已傳之於六腑六腑咳嗽不已面浮氣逆遂成水腫而不救也

○生脉道二

浮軟

言外指涉
○死脉五道

小沉伏大堅急

○不治症九名

乾咳嗽 肺脹嗽 肺癰嗽 肺痿嗽

多房室 多性躁 多怒 多憂 多思

○死症六名

水腫 形脫 熱不去 腹脹 嘔瀉

○治法開後

日夜嗽

是六腑氣乘或外邪日夜無度嗽不得安卧○

服紫金散

五更多嗽

胃中有食積至此時大氣流於肺諸邪或痰皆然○用藥與上半日多嗽相同

上半日多嗽

胃中有大有食積痰○服貝母石膏黃連

下半日多嗽

屬陰虛即癆嗽○服四物湯為主加知母黃柏黃昏多嗽

是火氣浮於肺不可用寒藥○用滋陰藥加五

諸難辨法卷四
倍子五味子訶子之類歛而降之

喉啞嗽

是寒包熱此言乍感邪而嗽○治宜散寒祛熱
聲嘶嗽

血虛受熱○服四物湯加青黛沙參桔梗紫苑
語聲不出嗽

諸咳嗽喘急語言不出○服人參散年久多服
見効杏仁煎

又內外挾邪語聲不出○服天門冬丸
肺破嗽

嗽出聲音覺破鑼聲唾血○服阿膠散

乾咳軟

有痰鬱火邪在肺用補陰降火藥加桔梗開之
○如瘦人腠理疎多汗血液少而為燥熱故多
成癆有聲無痰也治宜降火補水

肺癰嗽

咳口中辟辟燥咳胸中隱隱痛曰肺癰○服桔
梗湯

肺痿嗽

心火剋肺咳口中有濁唾涎沫胸膈痞滿咽隘

不利名曰肺痿○服人參平肺散

肺脹嗽

咳動喘滿氣急息重名曰肺脹或左或右不得
睡此挾瘀血凝氣而嗽○用四物湯加桃仁訶
子青皮竹瀝○凡人發喘而嗽必為肺脹欲作
風水症汗之則愈

虛嗽

肺氣虛或久嗽○用五味子款冬花紫苑馬薊
苓

脾肺虛寒嗽

服參蘇飲

服胃虛寒嗽

喘急坐卧不安○服人參清肺湯

氣血虛嗽

發寒熱自汗喘急痰涎○服寧肺湯

實嗽

肺氣壯實或有火邪○用黃芩天花粉桑白皮

杏仁

上盛下虛嗽

膈壅痰實喘嗽咽乾不利○服降氣湯又方加

歲時雜症法

減瀉白散

久嗽

嗽如面浮者○服滴油散

風入肺或積痰於肺腕中或挾濕○用雌黃丸
○多年不已常自汗服藥不効○服寧肺散

勞嗽

或左或右止可一邊眠卧轉一邊嗽甚不得卧
盜汗出兼痰多作寒熱○服補肺湯

老人嗽

久嗽不已睡卧不得○服杏仁煎

傷風嗽

咳嗽聲重身熱頭疼惡風自汗日夜嗽○服消風百解散或橘蘇散

傷寒嗽

頭疼身熱鼻塞無汗惡寒煩燥不渴○服麻黃湯

又因形寒飲冷或冬月坐卧濕地或冒風冷秋冬水中感之嗽急而喘○亦服前湯

傷冷嗽

因冷雨水淋身嗽○用喝藥

傷暑欬

煩熱引飲面垢自汗或吐涎沫聲嘶咯血○服黃連香薷飲

中暑欬

身熱自汗肺虛○服清暑益氣湯

傷濕欬

骨節煩疼四肢重著洒淅○服白朮湯或五苓散

傷燥欬

咳欬不已胸膈疼痛唾中有血皮膚乾燥細瘡

痒大便秘澁涕唾稠粘○服五味子散

傷火嗽

有聲有痰面赤火邪在中咳喘上壅涕唾出血
甚則七竅皆出○服黃連解毒湯

傷熱嗽

喘急面赤潮熱手足寒○服加減小柴胡湯

寒熱嗽

肺經寒熱不調痰涎不已○服八味款花散

寒熱往來嗽

寒熱往來肺氣不利嗽喘滿痰涎盛喉中呬呬

○服欬花散

肺軟

欬時發喘息有聲甚則唾血○服麻黃湯

心軟

喉中如梗狀甚則咽腫喉痺○服桔梗湯

脾軟

右脇下痛痛引肩背甚則不可動動則咳極○

服升麻湯

肝軟

兩脇下痛痛甚不可轉側兩肋下滿○服小柴

胡湯

腎軟

腰背相引痛甚則咳涎○服麻黃附子細辛湯

胃軟

軟時嘔嘔甚長虫出○服烏梅丸

胆軟

嘔苦水如猪胆汁○服黃芩半夏生姜湯

大腸軟

軟則遺尿○服赤石脂禹餘糧湯

小腸軟

小腸軟

欬時失氣○服芍藥甘草湯

膀胱欬

欬則遺溺○服茯苓甘草湯

三焦欬

因前五臟欬不已傳六腑六腑咳不已傳三焦

腹滿不欲食多涕唾面浮腫氣逆○服異功散

氣逆欬

欬時氣上喉中如水鷄聲○服射干麻黃湯

七情欬

喜怒憂思悲恐驚或因一件成欬者○七氣湯

飲食欬

飲酒過度煎燂辛熱傷肺咽痒咳多喘急脇痛
不得安卧○服紫苑湯

喘嗽

腫滿欲變水氣者○服白朮木香散

痰嗽

停痰流飲胸滿頭目眩○服和中化痰丸

嗽時面青脉絃四肢滿小便澁多怒○服青州

白丸子

嗽時面赤脉洪煩熱心痛口乾○服滾痰丸
嗽時面黑脉沉小便急痛足寒○服溫中丸

嗽時面黃脉緩肢躄沉重嗜卧腹脹○服白朮丸

嗽時面白脉澁氣上喘促洒淅寒熱喜悲不樂○服玉粉丸

嗽時發熱吐瀉○用黃連炒瓜蒌仁甘草各半兩白芍藥炒二兩滑石半夏各一两姜汁糊丸

○治法

凡咳嗽須分五臟六腑有聲有痰無聲無痰新久老幼虛實雜病外感

凡咳嗽須分四時五更上半日下半日黃昏日夜

凡嗽而無聲有痰者用半夏五味子白朮防風
松實甘草

凡嗽而有聲無痰者用生姜杏仁升麻五味子
防風桔梗甘草

凡嗽而有聲有痰者用白朮半夏五味子防風
久者加茯苓阿膠

凡喘嗽或肥人脉細氣弱少食有汗者用蒼朮
調中湯加黃芩蘇梗痰加半夏瓜蒌仁貝母

凡肺虛喘嗽懶倦不食不睡自汗發熱脉洪大
虛沉細用補中益氣湯加五味子知母麥門
冬汗多去升麻柴胡喘嗽甚加桑白皮地骨
皮

凡肺實喘嗽或火邪治宜瀉肺抑火

凡新嗽治宜劫

後開

凡久嗽治宜收斂

凡雜症嗽隨症用藥

凡外感嗽治宜發散

凡嗽春是春升之氣用二陳湯加杏仁知母五

味子川芎白芍藥麥門冬炒黃芩

凡嗽夏是夏火炎上最重潤肺益肝用二陳湯
去半夏加杏仁五味子桔梗桑白皮知母黃
芩麥門冬石膏

凡秋嗽是濕熱傷肺用二陳湯去半夏加杏仁
桔梗五味子桑白皮黃芩梔子蒼朮

凡冬嗽是風寒外束用二陳湯加桔梗麻黃杏
仁桂枝生姜防風頭痛鼻塞加藁本川芎

凡嗽脇痛用二陳湯加南星香附青皮白芥子

姜汁

凡軟心煩用六一散加辰砂

凡軟寒熱交作用小柴胡湯加知母

凡軟嘔吐喘促用瀉白散加青皮五味茯苓

凡熱嗽胸滿用小陷胸湯

凡氣血俱虛軟吐血用八物湯加知母麥門冬

阿膠紫苑

凡失音咳嗽用潤肺散訶子五味子五倍子合

粉蜜調嚙化

凡夜多嗽是風寒鬱熱在肺用三拗湯加知母

脉浮大有熱加黃芩生姜

凡遇冬便嗽是寒包熱也用桔梗麻黃陳皮防風紫蘇木通黃芩

凡肺虛受風寒兼內因過度咳嗽惡風用人參四錢麻黃一錢半連根節二三貼愈

凡腹痛中脘冷氣嘈雜腸鳴吐清水脇肋急脹用二陳湯加細辛桂枝桔梗芍藥

凡酒嗽用青黛瓜蒌仁去油蜜丸噙化

凡人壯實好酒脉實數嗽者用涼膈散

凡痰多喘嗽用白朮蒼朮半夏香附杏仁各一

兩黃芩三錢姜汁糊丸如痰積非青黛瓜蒌

仁不除

凡乾咳嗽乃痰鬱火邪在肺用桔梗開之用補
陰降火藥不止成癆須用倒倉法

凡用劫嗽藥五味子五錢五倍子風化硝各一
錢甘草二錢半為末蜜丸噙化

凡新久諸嗽用劫藥自胸膈下塞停飲至臟腑
用知母貝母各一兩為末巴豆三十粒去油
另研入二藥和勻每用四五分姜三片兩面
蘸藥末對合細嚼嚥下次早下一次即溫補
之小兒用藥末二三分

凡病久嗽屬虛屬鬱氣虛用四君子湯血虛用
四物湯兼開鬱用撫芎貝母杏仁去皮尖沙
參白茯苓各一錢橘紅五味甘草炙已上之
藥為主四時隨證加減服此則治久虛嗽之
法也

凡食積嗽食積成痰用香附朮萋仁滑石半夏
麴山查肉枳實黃連姜汁炒為丸服

凡咳嗽見血多是肺受熱邪忌用人參甘溫之
藥氣虛嗽出血者不在禁限

凡先咳嗽而後有痰者治嗽為重消痰次之

凡先有痰而後嗽者治痰為重寧嗽次之

凡酒色過度損傷肺腎咳嗽吐痰血服參芪甘溫之藥則病日增服之過多則死

凡用杏仁瀉肺氣散風熱然性實有熱因於寒者用之得宜肺虛久嗽一二服却止

凡用桑白皮瀉肺氣然性不純良用之多者宜戒

凡用瓜蒌仁秘汗補肺潤肺能下氣胸有痰肺受火逼失降下今得甘緩潤下之功痰自降治嗽良藥也

凡用訶子味酸苦有收斂降火之功
凡用五味收肺氣補五臟津液虛火熱必用之
藥但有南北之分用南五味發散風寒用北
五味生津液止渴此藥不可輕用恐阻邪氣
在內必先發散後用之可也

凡用半夏南星口燥咽乾不可用

凡用馬兜鈴能去肺熱補肺

凡用生薑味辛能發散

射干麻黃湯

射干

細辛

款冬花

紫苑

各一錢半

麻黃

生姜

錢各二

半夏

錢二

五味子

錢一

右大棗二枚水

二鍾煎七分作一次服

白朮木香散

白朮

猪苓

甘草

澤瀉

茯苓

各半

木香

枳殼

各三

陳皮

二

桂枝

錢二右為末每服五錢姜一片水煎服

五味子湯

五味子

桔梗

紫苑

甘草

錢各二

生地

桑皮

各半

竹茹

錢三

續斷

錢二

右分作二貼用水

二鍾煎七分服

加減小柴胡湯

柴胡

半夏

黃芩

五味子

乾姜

甘草

各等分

右用水煎服

加減瀉白散

桑白皮

一斤

地骨皮

七錢

陳皮

五味子

青皮

白茯苓

人參

各五錢

右分作八服每服用水煎

入粳米二十粒

寧神散

粟殼

醋炒一兩

烏梅

兩半

右為末每二三錢沸湯調下

補肺湯

桑白皮

熟地

各二兩

川五味

人參

紫苑

黃芪

各一兩

右為末每服二錢水煎入蜜少許服

白朮丸

南星

半夏

各一兩

白朮

一兩

右為末湯浸蒸

餅為丸如梧桐子大每服五六十九姜湯下

玉粉丸

南星

半夏

各一兩

陳皮

去白一兩

右為末湯浸蒸

餅為丸梧桐子大每服三四十九人參姜湯下

黃芩加半夏生姜湯

黃芩

生姜

各三錢

甘草

芍藥

各二錢

大棗

二枚

上

半夏斜右用水煎服

桔梗湯

苦桔梗錢三甘草錢六右用水煎服

芍藥甘草湯

芍藥 甘草各四錢右用水煎服

升麻湯

升麻 白芍藥 甘草各二錢葛根錢三水煎服

烏梅丸

烏梅三十箇細辛 附子 桂枝 人參

黃柏錢六乾姜 黃連半兩當歸 蜀椒

各四 右酒浸烏梅一宿去核煮之與米飯搗如泥和諸藥末相得加蜜為丸如梧桐子大每服三十九用白湯送下

麻黃湯

麻黃

錢三

桂枝

錢二

甘草

錢一

杏仁

錢廿

水煎服

赤石脂禹餘糧湯

赤石脂

禹餘糧

各二兩

止打碎

右用水煎服

麻黃附子細辛湯

麻黃

附子

細辛

各一錢

右用水煎服

甘草湯

甘草湯

茯苓

錢二

桂枝

半二錢

生薑

片五大

甘草

錢一

水煎服

異功散

人參

茯苓

白朮

甘草

各等分

右為

粗末每服二三錢入姜枣水煎服

華蓋散

麻黃

紫蘇子

杏仁

赤茯苓

桑皮

橘紅

各一錢半

甘草

錢一

右用水二鍾生薑五片紅棗

一箇煎至一鍾去滓不拘時服

橘蘇散

橘紅

紫蘇葉

杏仁

五味子

半夏

桑白皮

貝母

白朮

錢各一

甘草

半七分

右用

水二鍾生姜五片煎至一鍾不拘時服

白朮湯

白朮

錢三

白茯苓

半夏

橘紅

錢各二

甘草

五味

錢各一

右用水二鍾生姜五片煎至一鍾服

麻黃湯

麻黃

節不去

杏仁

皮不去

甘草

用生

荊芥穗

桔梗

錢各三

右用水二鍾生姜三片煎至一鍾食遠服

咽喉痛者煎熱後加朴硝少許

和中化痰丸

良姜

青皮

乾姜

陳皮

各半兩

右為

細末醋煮麪糊為丸如梧桐子大每服五十丸
食後用米飲送下

人參清肺湯

人參

阿膠

杏仁

罌粟殼

知母

烏梅

桑白皮

甘草

地骨皮

各一錢

右

用水二鍾入紅棗一箇煎至一鍾食遠服

八味欵花散

欵冬花

紫苑

五味子

甘草

各一錢半

麻黃

桑白皮

杏仁

各一錢

右用水二鍾煎一鍾入黃

蠟一塊如皂角子大食後服

降氣湯

紫蘇子

川芎

細辛

當歸

桔梗

白茯苓

厚朴

陳皮

前胡

肉桂

半夏麴

甘草

各一錢

右用水二鍾生薑五片紫

蘇五葉同煎至一鍾去滓食後服

桔梗湯

桔梗

貝母

薏苡仁

桑白皮

當歸

枳殼

防己

各一錢

瓜蒌仁

一錢

甘草節

杏仁

百合

各半

黃芪

一錢

右川水二鍾生薑五片煎

一鍾不拘時服大便秘加大黃少便少加木通
紫苑湯

紫苑

款冬花

百合

杏仁

阿膠

貝母

半夏

蒲黃

經霜桑葉

各一錢

犀角

人參

甘草

各七分半

右用水二鍾生

姜五片煎至一鍾食後服

杏仁煎

杏仁

胡桃肉

各等分

右共碾為膏入煉熟蜜

少許和丸如彈子大每服一丸食後細嚼生薑

湯送下

人參平肺散

人參

青皮

天門冬

地骨皮

陳皮

甘草

各一錢

知母

半一錢

桑白皮

錢二

五味子

錢三

右

用水二鍾生姜五片煎一鍾食遠服如熱加黃芩紫蘇半夏各一錢

寧肺湯

人參

當歸

熟地黃

五味子

白朮

川芎

白芍藥

麥門冬

桑白皮

茯苓

甘草

各一錢

阿膠

半一錢

右用水二鍾生姜五片煎

至一鍾食後服

人參散

人參

知母

貝母

馬兜鈴

麻黃

杏仁

生用

半夏

各半錢

天仙藤

錢一

右用水二鍾

烏

梅一箇蜜一匙煎至一鍾臨睡服

紫蘇飲子

紫蘇葉

五味子

青皮

桑白皮

杏仁

麻黃

陳皮

半夏

人參

甘草

各一錢二分

右用水二鍾姜三片煎一鍾食後服

欬花散

欬冬花

桑白皮

半夏

知母

各半錢

貝母

阿膠

麻黃

錢各三

杏仁

甘草

錢各二

右作

二貼每用水二鍾姜三片煎七分不拘時服

杏仁煎

治嗽失音

杏仁

二兩

生姜汁

蜜糖

各一兩半

桑白皮

貝母

木通

各一兩

紫苑

五味

各一兩

右剉碎用水三

升熬至半升去滓入前杏仁等四味再熬成膏

每服一匙含化

青州白丸子

大半夏

白附子

天南星

川烏

天麻

全蝎

各半

右為末用生姜自然汁煮麴糊和丸

如梧桐子大每服三十九食後用熱水送下癰
瘰風用溫酒送下日進三服常服永無風痰膈
壅之疾小兒驚風服二十九用薄荷湯化下
滴油散

右以直蛤粉一味新瓦炒冷通赤地上出火毒
拌青黛少許同酸壘水滴麻油數點服即愈

紫金散

天南星

白礬

甘草

各半

烏梅肉

二

右為

麝散用慢火於銀石器內炒令紫色放冷研為
細末每服二錢臨卧時身軀入鋪卧內用酸壘

汁七分溫湯三分煖令稍熱調前藥末服之
下便仰卧低枕想藥入於肺中須臾得睡其嗽
立止

治久咳嗽

右以蝙蝠去頭燒令焦為細末每服二錢不拘
時米湯調下

天門冬丸

天門冬

紫苑

百合

杏仁

貝母

麥門冬

人參

半夏

桔梗

桂心

阿膠

橘皮

甘草

生乾地黄

各三兩

右為細末，煮糯米粉與黃蠟一兩成粥，更入蜜再熬勻，和前藥末丸如櫻桃大，每服一丸，同生薑細嚼下，軟時服，咳嗽膿血者服之，大効。

阿膠散

阿膠

分二

天門冬

北五味

生地黃

人參

茯苓

分各一

白芨

分二

右除白芨別為細末，餘藥每

三錢，一大盞入蜜五匙，臨熟入白芨末少許，

食後溫服。

款花散

右用款冬花一斤，曬乾為末，到夜上床睡，如燒

香一般置香炉於布帳中燒烟起吸烟入口則
熱之不吸亦可若咽乾口燥用冷茶呷之重嗽
數日見効

三奇散

款冬花○物耳草一兩熟地黃二兩俱為末香炉中
燒之用紙作筒子一頭大一頭小大頭安在香
炉上以口含小頭吸烟盡為度以冷茶吸之如
有涎唾之兩服除根

參蘇飲

水香

紫蘇葉

人參

乾葛

半夏

前胡

茯苓

各七錢半

枳殼

桔梗

甘草

橘

紅兩各半

右呔咀每服四錢水盞半姜七片棗

一枚煎六分去滓不拘時服以氣盛者去木香

三拗湯

甘草

麻黃

不去節

杏仁

各錢八分

右呔咀用

水一盞姜五片煎服以得汗為愈

團參飲子

人參

紫苑茸

款冬花

阿膠

百合

細辛

杏仁

天門冬

半夏

五味

經霜桑葉

各一兩

甘草

兩半

右呔咀每服四

錢水盞半姜五片煎七分食後溫服

溫中丸

白朮

二兩

乾姜

半夏

各一兩

細辛

胡椒

錢各五

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服五十丸

空心姜湯送下

七氣湯

半夏

五兩

厚朴

桂心

各三兩

人參

一兩

茯苓

白芍

各四兩

紫蘇葉

橘皮

各二兩

右㕮咀每服四

錢水一盞姜七片棗一枚煎五分空心熱服

涼膈散

大黃

朴硝

甘草

各半錢

連翹

錢一

梔子

黃芩

蒲葑

各二分半

淡竹葉

片五

右用水一盞煎

至八分去粗入蜜一匙和勻服

消風百解散

荊芥

白芷

陳皮

麻黃

蒼朮

甘草

各等分

右用水二鍾生姜三片煎八分服

黃連解毒湯

見火門

小陷腦湯

見傷寒門

蒼朮調中湯

開米卷

小柴胡湯

見熱門

補中益氣湯

見脾胃門

二陳湯

見痰飲門

黃連香薷飲

見暑門

滾痰丸

見痰飲門

姜桂丸

卷開末

唯黃花

卷開末

六一散

疾見南門

五苓散

渴見世門

喝藥

卷開末

清暑益氣湯

見暑門

八物散

湯即四君子湯

四物湯

見諸血門

倒倉法

卷開末

四聖

喘門

附哮共
二十名

火熱動於上喘急乃作屬肺主之又曰諸氣上而
不行升而不降否塞膈中氣道奔迫喘息有聲也
有風寒濕邪氣干肺作喘者有喜怒氣鬱而生痰
作喘者有脾腎俱虛不能攝養一身之痰而喘者
有脾濕腫滿水氣乘肺而喘者有陰血虛少而上
喘者名雖不同而病皆出於肺治宜滋陰養血外
感喘者祛散之內之氣鬱而喘者以順氣為先腎
虛喘者宜溫補痰盛喘者當以疎導臨期消息治

之無不愈矣

○生脉道一

脉滑手足温

○死脉道一

脉濇四肢冷

○難治症名二

產後發喘 四肢冷兼脉濇

○辯驗喘法

喘與脹兩症相因必皆小便不利喘病則變
脹脹病必變喘但要識得漂本先後先喘而

後脹者肺主之先脹而後喘者脾主之
肺邪而上喘則失降下之令故小便漸短以致
水溢皮膚而生腫滿此則喘為本腫為標治
當清肺降氣為主行水次之肺病用燥脾之
藥喘反甚

脾受傷不能制水濕行浸肌肉水既上溢則邪
反浸肺氣不得降而生喘此則腫為本喘為
標宜實為主清金次之脾病用清肺之藥則
脾寒脹甚

○治法

凡治喘須分虛實新久

久病是氣虛用阿膠人參五味子補之
新病是氣實用桑白皮葶藶瀉之

凡喘降氣化痰為主

凡喘大炎上者降心火清肺金

凡喘陰虛兼痰喘者宜四物湯加枳殼半夏
凡有痰亦短氣而喘用導痰千緡湯

凡上氣喘而躁者是肺張欲作風水症汗之則
愈

凡喘不得卧卧則喘甚用神秘湯

凡久喘未發時扶正氣為主已發攻邪為主
凡喘急甚火盛故也宜溫藥劫之後因痰治痰
因火治火

凡喘急有風痰者用干絳湯

凡食積壅滯氣喘者用半夏瓜蒌仁去油神麴
炒山查肉姜汁竹瀝為丸白湯下

凡憂慮多痰喘者用四物湯加半夏陳皮甘草
凡喘氣實服參芪藥過多用三拗湯瀉之

凡熱痰暴喘將死者用大黃黑牽牛炒各等分
為末蜜丸服二錢

凡傷風寒喘者用三拗湯

凡肺脹喘急聲啞痰壅用大黃白牽牛半生半熟
枳柳各等分為末每服二錢水下涎多加
膩粉少許下涎為度

風寒冷濕發喘

服華蓋散

傷風發喘

服麻黃散

傷寒發喘

見傷寒門

肺氣上喘

服人參定喘湯

肺氣不利發喘

服團參湯

肺氣不足發喘

服人參潤肺湯

肺壅有膿發喘

服消膿飲

脾胃不和發喘

服分氣紫蘇飲

邪入六腑發喘

身熱不得卧○治宜發表

虛陽上攻發喘

服蘇子降氣湯

酒熱上攻發喘

服五苓散去薄桂加黃芩乾葛

飲食煎燇發喘

服葶藶散加黃連

痰喘

痰喘不得卧人扶或倚靠可坐○服千絳湯

七情鬱結發喘

服四磨湯

墮跌驚恐發喘

服杏仁散

年久發喘

服安神散

哮喘

大率主痰戒服涼藥要淡薄滋味藥中多用醋

治宜用吐虛人不可吐須帶散表藥

治哮喘年深時作時止

用雄猪肚一箇入杏仁四兩線縫醋三碗煮乾
取出先食肚次以杏仁新瓦上焙氣皮旋食
永不發○又方用猪鬃頭骨燒灰酒下一服即
止

哮喘

壯實人遇秋冬發者用大承氣湯

哮喘

遇厚味發者用蘿蔔子淘淨蒸熟曬乾為末姜
汁糊丸如糰大每服三十丸津嚥下

神秘湯

人參

桑白皮

木香

茯苓

紫蘇

陳皮

各半

右水二鍾姜三片煎八分服

調中益氣湯

升麻

分二

黃芪

錢一

甘草

分五

蒼朮

分四

柴胡

橘皮

各二分

木香

分一

人參

分五

右用水二鍾煎八

分食前熱服

定喘丹

杏仁

研

馬兜苓

蟬蛻

洗去土并足切研

研別右為末蒸棗肉為丸如菜子大每服六七

丸臨睡用葱茶清放冷送下忌熱物半日

消腫飲

南星

半夏

生地黄

知母

川芎

防風

貝母

桑白皮

阿膠

射干

桔梗

薄荷

天門冬

杏仁

紫蘇

白芷

烏梅

白芨

各等分

甘草

減半

右每服

一兩水二鍾生姜五片煎至一鍾食後服

安神散

粟殼

炒

人參

陳皮

各三錢

甘草

半錢

右為

末每服一二錢食後烏梅湯調服

加味控涎丸

大戟

芫花

苦葶藶

甘遂

各三錢

牽牛

頭末一兩

巴豆錢一

右為末滴水和丸如粟米大

每服三丸茶清下湯亦可

千緡湯

半夏

七箇泡七次每箇切作四片

皂角

去皮絃子炙一寸

甘草節

一寸

右作一服用水一鍾生姜如指大一塊煎至半

盞服數貼瘡

加減瀉白散

青皮

二兩

桑白皮

一兩

地骨皮

知母

陳皮

各三兩

甘草

枳殼

各半兩

甘草

各三兩

右剉如麻豆大每服半兩

水二鍾煎至一鍾食後溫服數貼愈

麻黃散

麻黃

款冬花

錢三杏仁半

錢

肉桂

二錢

訶子

肉

錢一

甘草

錢一

右作二貼每貼水二鍾茶一

錢煎至一鍾食前服

葶藶散

甜葶藶

桔梗

瓜蒌仁

桑白皮

苡仁

葛根

各錢半

甘草

錢一

右水二鍾加升麻一撮生姜

五片煎至一鍾食後服

人參定喘湯

人參

半夏麴

五味子

罌粟殼

麻黃

阿膠

甘草

錢各一

桑白皮

錢二

右用水二鍾生

姜三片煎至一鍾食後服

團參散

紫團參

錢三

紫苑茸

錢三

款冬花

錢二

右水二鍾烏梅

一箇煎至一鍾食遠服

杏仁散

杏仁

大腹皮

人參

橘紅

檳榔

白朮

訶子肉

半夏

桂心

紫苑

甘草

桑白皮

錢各一

右用水二鍾

姜三片紫

蘇七葉煎至一鍾去滓不拘時服

四磨湯

沉香

檳榔

人參

天台烏藥○右

各濃磨水共取七分煎三五沸不拘時服

人參潤肺湯

見咳門

華蓋散

見咳門

蘇子降氣湯

方見氣門

五苓散

見泄門

分氣紫蘇飲

方見氣門

四物湯

見諸血門

大承氣湯

見脾胃門

三拗湯

見咳門

暑門

有十四名

炎暑之氣在天為熱在地為火在入臟為心且暑者相火行令夏月人感自口齒而入先着於心伏三焦腸胃之間凡中之者其熱傷氣而不傷形也乃六淫中無形之火五行中有形之水制之則輕如注夏之病重則面垢發渴昏不知人或吐或瀉或眩暈頑痺至甚瞽問懊懷而死每歲夏令天道氣虛人身肖天地豈不虛乎故孫真人用人參五味葶麥門冬名曰生脉散當此之時而服也益金

水以禦火土之旺又令人夏食寒以扶陰氣養其陽也每夏陽氣浮於肌表散於皮毛腹中之陰氣實而陽氣虛矣潔古治暑分傷暑中暑最為切當暑熱之時無病之人在高堂大厦乘風納涼靜而得之名曰中暑行人農夫日中勞役動而得之名曰中熱寒邪傷形暑熱傷氣若元氣虛極受病有一時不能救者與傷寒陰毒傾刻害人無異人之元氣虛實不同治之之法豈可執一者也

○總脉

脉浮大散兼惡臭身熱煩心痛為正邪

傷暑脉虛兼身熱是為財邪

○死症

名

中熱脉絃細扎遲其症發熱惡寒身重疼痛
毛聳手足冷口開齒燥死 五臟中熱死
傷暑服燥熱藥致發斑發黃小便不通悶亂
死 傷暑服冷藥死

面垢發渴昏不知人或吐或瀉或眩暈頑痺
死 悶瞢懊懣者死

○辯驗暑症法

暑症其脉虛其症頭疼口乾面垢自汗倦怠

少氣或背寒惡熱

○治法

凡暑病道途無湯藥即以熱土熨臍中仍使更換熱土不可移在冷地上卧

凡覺中暑急嚼生薑一大塊水送下如已迷悶嚼大蒜一大瓣水送下如不能飲水研灌之立醒

凡夏月暑症不可服燥熱藥致斑毒發黃小便不通悶亂而死

凡傷暑切不可服冷藥服之則死

凡暑病須分傷暑中暑傷熱中熱

凡暑症宜清心利小便甚妙如自汗不可利小便宜白虎湯清解之次分表裏症表症必頭疼惡寒服雙解散加香薷

凡暑症在半表半裏泄瀉煩渴飲水吐逆以五苓散治之熱甚煩渴益元散治之若表裏熱甚半夏解毒湯

開末

凡虛弱老人冒暑膝微下利渴而喜溫或厥冷不省人事宜竹葉石膏湯加熟附子一片冷飲

凡暑症用黃連香薷飲清暑益氣湯五苓寺湯
挾痰加南星

如肥白人或元氣虛者加人參

如微熱食不知味清暑益氣湯

如倦卧脚弱精神少頭痛惡熱燥大渴有汗
服白虎湯加人參

如暑病頭痛惡寒拘急肢節疼無汗服大順
散或白虎湯加蒼朮主之

如氣虛身熱少食自汗脉細弱或洪大服補
中益氣湯加麥門冬五味子知母

中暑

富貴者在高堂大厦乘風納涼名中暑頭疼惡寒身軀拘急肢節疼痛煩心肌膚火熱無汗○服大順散

中暑

行人農夫勞役名中暑其症頭痛發燥熱惡熱肌膚大熱大渴欲飲汗大出無氣以動○服蒼朮白虎湯

暑傷肺

喘滿痰壅○服六和湯

暑傷心

噎悶昏不知人○服龍鬚散加香薷

暑傷脾

昏睡不覺○服人參益氣湯

暑傷肝

眩暈頑痺○服枇杷葉散

暑傷腎

消渴○服桂苓甘露飲

已上五臟傷暑則病中熱則死治之切不可
用冷藥唯宜溫養得冷則死

暑傷脾胃

怠惰嗜卧四肢不收精神少兩脚軟早晚痿日
高之後熱如火乃脾胃俱虛○服十味香薷飲

暑傷心胞絡

其脉虛外症頭疼口乾面垢自汗倦怠少氣或
背惡寒惡熱氣甚者迷悶不省為癰亂為癰為
瀉痢痰滯嘔逆為發黃生斑若其脉虛浮暑兼
風邪名曰暑風○服黃連香薷飲加羌活

暑傷血

四肢倦精神少懶動作胸膈氣促肢節沉疼或

氣喘身熱煩心下膨痞小便黃少大便溏頻或利黃沫或如泔色或渴或不渴不思食自汗體重或汗少此乃血病氣不病○服清暑益氣湯暑風

夏月卒風不省人事挾火挾痰○用二陳湯加黃連實者可用吐法

傷暑老人虛人素弱人

其脉微其證下利渴喜溫厥冷不省人事○服竹葉石膏湯加熟附子半箇冷飲次服五苓散陰虛熱厥

四肢如在火中腹中有熱○服竹葉石膏湯
氣虛寒厥

四肢寒冷腹中有寒○服黃連香薷飲去黃連

桂苓甘露飲

桂 人參 藿香各半 茯苓 白朮

甘草 葛根 澤瀉 石膏 寒水

石各一兩 滑石二分 木香錢一 右為末每服三錢

白滾湯送下

人參益氣湯

黃芪

錢八

甘草

錢七

人參

錢五

升麻

錢二

五味

子

一百粒

白芍藥

錢三

柴胡

半錢

右作

四貼水

二

鍾煎七分服

大順散

甘草

乾姜

杏仁

桂

各等分

右先將

甘草白砂炒次入姜下杏仁炒篩去砂靜合桂

為末每服二錢白湯調下

清暑益氣湯

黃芪

升麻

蒼朮

錢各一

人參

白朮

神麴

陳皮

各五分

甘草

黃栢

麥門

當歸

各三

乾葛

分二

五味子

九粒

澤瀉

分五

青皮

分二右水二鍾煎八分服

六和湯

砂仁

半夏

杏仁

赤茯苓

人參

藿香

香薷

厚朴

白扁豆

木瓜

甘草

各一分

右水二鍾煎至八分不拘時服

竹葉石膏湯

石膏

錢五

麥門冬

人參

錢各二

甘草

分五

半夏

一錢五分右用水二鍾姜三片青竹葉十四片粳米

一撮煎至一鍾不拘時服

黃連香薷飲

香薷

錢二

厚朴

黃連

錢各一

右先將厚朴黃

連同生姜搗細在藥礮內慢火同炒令紫色取
起入香薷水酒各一鍾煎至八分去粗水中浸
冷服

治中暑迷悶欲死

用蒜一瓣生嚼以新汲水送下如不能嚼水研
灌之立可効熱死人切勿與冷水及卧冷地正
如凍死人須先與冷水若近火即死○一法行
路熱死人惟得置日中以熱湯灌之即活

枇杷葉散

枇杷葉

毛去

厚朴

陳皮

丁香

各錢五

麥門

白茅根

乾木瓜

甘草

各一兩

香薷

七錢半

右為

細末每服二錢冷水調服

龍鬚散

五味子

二兩

烏梅肉

二兩

甘草

半兩

肉

飛羅面

二兩

枯白

礬

一兩

右為細末每服二錢新汲水調下一服愈

十味香薷飲

香薷

人參

白廬豆

陳皮

白朮

黃芪

甘草

厚朴

木瓜

茯苓

藥法卷四 果附

錢各五 右為細末每服二錢白滾湯調服

雙解散

滑石 一兩

甘草 二兩

防風

川芎

當歸

芍藥

大黃

薄荷

麻黃

連翹

芒硝

各二錢半

石膏

黃芩

桔梗

各五錢

荊芥

白朮

梔子

各二錢

右為末每服二錢水一大

盞生姜三姜煎至六分溫服

補中益氣湯

見脾胃門

益元散

見痢疾門

蒼朮白虎湯

開胃末

五苓散

見泄瀉門

白虎湯

見門

二陳湯

見痰飲門

注夏門

一名

春末夏初火氣浮泄於表濕熱隆盛每遇斯時人多見日色則目昏惡心肢體因倦精神短少身熱頭疼腳軟少食脉大乃是陰虛元氣不足謂之注夏緣客氣旺主氣衰熱傷元氣而然也故古人立法夏服補劑者補天真元氣也用補中益氣湯去柴胡升麻加黃柏芍藥枳殼加半夏陳皮加減地黃丸

熟地黃

八兩

乾山藥

四兩

山茱萸

四兩

牡丹皮

三兩

人參

白茯苓

麥門冬

澤瀉

各二兩

五味子

黃柏

各一兩

右為極細末用蜜一觔半煉蜜滴水成珠

為度入前藥末石臼內杵干下丸如梧桐子大
空心服三錢午間服二錢俱用白滾湯送下臨
夜服二錢或酒或湯或米飲送下每日準準服
三次俱要飲食壓之則不發飽每歲三月預先
服起至八月中止

補中益氣湯

見脾胃門

濕門

有十四名

此門與膨脹水腫二門互相查考治病
濕乃土氣土乃濕之母故濕病多從熱生蓋火熱
能生土濕也六氣之中濕熱為病十居八九書曰
因傷濕熱大筋綆短小筋弛長綆短為拘急弛長
為痿內之濕是酒麪湯液臠物甘滑炙辣膏粱過
度薰蒸濁液不行湧溢於中重則令人病強直癰
亂吐利輕則令人痞滿怠惰嗜卧沉重無力濕流
關節煩疼注絡脉屈伸不可轉側滯經絡發腫肉

軟如泥按之不起其脉沉濡此從上從內而起治法急食苦以燥之宜利小便為之治內治下之法也外之濕是霧露陰雨澡浴為風所關或涉水為寒所收汗出迎風坐卧卑濕之地令人頭重鼻塞發寒熱身色似薰黃濕入骨節重痛足趺浮腫其脉浮緩此從下從外而起急食甘辛之藥宜發汗為之治上治外之法也全存醫之識病分內外虛實六淫七情所感的在何經受症治之始為盡善也

○總脉

沉細微緩澀濡皆中濕 兼浮脉風濕

○不治症

犬下後汗出喘小便澀 大便利不止

○死症

中氣弱挾痰冒風作中風治

○辯驗濕法

強直痞隔中滿吐下體重肘腫以手按之不起其濕不速治生熱濕熱傷大筋則短縮為拘攣傷小筋則弛長為痿弱濕重體腫不能

轉側

○謹戒

遠卑濕地

羊肉

鯉魚

白酒

麴

醋

潮潤衣被

猪肝

鱖魚

胡椒

麵

蒜

○治法

凡治濕理脾胃清熱利小便治濕不利小便非

其治也

凡濕病分濕熱寒濕

濕熱脉洪小便赤渴身熱煩喘胸滿發黃或

痛

寒濕脉遲小便清大便或溏或瀉身疼不熱

汗

凡治濕病切不可大下

凡治濕用瓜蒂取水法

凡治濕用米泔伴蒼朮炒為主藥

凡濕病在腰已上自外起者宜發微汗解衣為主
隨虛實證加減

凡濕病在腰已下自內起者五苓散為主
隨虛實證加減

凡溼濕湯治本論中一應外傷濕病

凡清燥湯治本論中一應內傷濕病

凡濕病非白朮不可以去非蒼朮不可以去濕
辭

凡用二陳湯加酒炒黃芩羌活蒼朮散風行濕
最妙

凡濕勝氣實人用神祐丸或舟車丸虛人用桑
白皮白朮葶藶木通

凡肥人多濕用白朮澤瀉為主藥

重濕

令人小便不利大便反快身痛煩脉來沉緩宜
急利小便○服大橘皮湯

風濕

令人一身盡痛發黃小便自利肢體重着不可轉側額上微汗不欲去衣被身微腫脉來浮當燥陰土宜微微發汗隨服麻黃薏苡仁甘草白朮喘加馬兜苓杏仁五粒

寒濕

身體重着腰脚酸疼大便溏泄小便赤澀○服除濕湯

暑濕

傷濕復傷暑者不可發汗若發汗令人耳聾不

能言不知痛痒。服四君子湯加香薷澤瀉木
通

濕熱

心腹脹滿水腫小便不利大便滑泄。服大橘
皮湯

濕溫

凡經發汗過多風去濕存兩脰逆冷腹滿頭目
痛多汗妄言其脉陽濡弱陰急小。服四君子
湯五苓散各半

濕火

五苓散加山梔杏仁黃柏若徒其性治升麻柴胡

濕痰

脾胃弱蓄痰冒風露令人涎潮壅塞口眼喎斜半身不遂昏不知人與中風相似但脉沉濡細若作中風治致危○服白朮酒

酒濕

男子婦人雜症酒濕○服金砂流濕丸

濕痺

令人關節疼煩滿體重頑麻脉來沉細○服四

物附子湯

濕傷血

其症身如破杖乃濕傷血也

陰濕

脉緩弱昏迷腹痛身重自汗失音不利不禁用
白虎湯葱白乾姜附子白朮

下焦濕

腫痛并膀胱有火邪者用防己黃柏知母龍胆
草去蒼朮

肥人多濕

四物附子湯

附子

半錢

肉桂

錢一

白朮

錢三

甘草

錢一

右水二

鍾煎至一鍾不拘時服

瓜蒂取水法

治傷濕鼻塞頭疼

瓜蒂為末先含水一口用芦管吹藥少許入鼻

內流出黃水効

白朮酒

白朮

酒一

三鍾煎至一鍾服

天麻散

風濕癱瘓

天麻

全蠍

各四錢

熟地黄

木瓜

烏頭

當歸

各三錢

牛膝

二錢

乳香

沒藥

川芎

川山甲

粉各一錢

去蛤

右為末每服二錢酒調服

金沙流濕丸

男婦雜症

海金沙

五錢

木通

郁李仁

木香

各一錢

澤瀉

白茯苓

大黃

各兩

滑石

黑白牽牛

取各末

五右為末水丸如梧桐子大每服六七十丸生

姜湯下忌麪○婦人血氣不調當歸湯送下

卜便不通灯草湯下

傷酒生薑湯下

仁食黃蘿蔔湯下

心疼韭根湯下

八高良姜湯送下

膈氣枳實湯下

肢節疼痛溫酒送下

除濕湯

半夏麴

陳皮

錢各半

茯苓

錢二

厚朴

藿香

甘草

錢各一

白朮

錢半

分作二服每服水二鍾姜

三片煎至八分食前服

滲濕湯

白朮

錢三

乾姜

白芍藥

附子

茯苓

人參

錢各一

桂枝

錢大

甘草

錢各五

右水二鍾煎至

一鍾不拘時服

清燥湯

黃芪

半一錢

黃連

分一

蒼朮

錢一

五味子

九

白朮

橘紅

分各五

人參

分三

麥門冬

生地黃

當歸

猪苓

神麴

甘草

分各二

白茯苓

分二

黃柏

柴胡

分各一

升麻

分三

澤瀉

分五

右用水煎服

白虎湯

石膏

兩四

知母

半二

兩

甘草

兩一

粳米

合一

右呔咀

每服用一兩水二盞半煎一盞去滓服

大橘皮湯

見水腫明

五苓散

見泄瀉明

四君子湯

見脾胃明

二陳湯

見痰飲明

舟車丸

神祐丸

已上利緩

人二九其甚速不藥綠

惡寒門一名

此門與火熱門互相查考治病

惡寒非寒明是熱症亦有久服熱藥而惡寒者謂之火極似水熱甚反覺自冷的非寒也有誤服熱藥而少愈者為辛溫發散鬱遏之氣暫開所以少愈耳

○總脉

脉滑數但按之鼓擊於指下

○辯寒

病人身寒厥冷非寒也名曰陽盛格陰

○治法

用升麻柴胡澤瀉羌活黃柏黃芩此則通應
通用之劑甚則大黃朴硝

凡惡寒兼發熱用柴胡蒼朮

凡惡寒病久亦用解散鬱藥

凡惡寒不得熱是無火此乃明是熱症而反惡
寒為心火不足宜益心火制瀉腎水有餘

凡肥白人久病虛弱惡寒是氣虛用人參黃芪
之類

惡熱門

一名

此門與虛損門互相查考治病

惡熱非熱明是虛証經云陽在外為陰之衛陰在內為陽之守精神外馳嗜慾無節則精血耗散陽無所附遂致浮散於肌表之間而惡寒也當作陰虛治之

○總脉

脉數但按之不鼓擊於指下

○辯熱

病人身熱非熱也名曰陰盛格陽

○治法

用加減地黃丸方見注夏門

凡惡熱不得寒是無水此乃明是虛症而反惡熱為腎水不足宜補益腎水制瀉心火有餘